## ПАМЯТКА

## для студентов, сотрудников УлГТУ

## ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА

Возможные ситуации	ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
1. Звук сирены и прерывистые гудки на предприятиях и транспортных средствах.  Это означает сигнал оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» - способ оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.	1. Немедленно включите радиоприемник и настройте его на волну местного радиовещания, телевизионный приемник на первую или местную программу, а также включите динамик радиотрансляционной сети для прослушивания информационного сообщения о чрезвычайной ситуации.  2. Прослушайте экстренной сообщение органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - МЧС России) и действуйте в соответствии с информацией быстро, но без суеты и паники.
2. Подготовка и проверка противогаза.	1. Удостоверьтесь, что вы взяли противогаз вашего роста и произведите его внешний осмотр:  - фильтрующей противогазовой коробки - нет ли в ней проколов, вмятин, не деформирована ли резьба на горловине коробки;  - маски - нет ли проколов, порезов, надрывов резины, наличие и целостность ниппельного резинового кольца во вдыхательном клапане, трещин стекол очков;  - соединение противогазовой коробки с маской - проверьте противогаз на герметичность, закрыв ладонью или резиновой пробкой безрезьбовое отверстие противогазовой коробки. Если вы не можете сделать вдох - это значит, что противогаз герметичен.
3. Необходимо надеть противогаз (проверка работы)	1. Закройте глаза, задержите дыхание. 2. Наденьте противогаз. 3. Сделайте резкий выдох и откройте глаза.
4. Резкий запах нашатыря в помещении, квартире, виден затуманенный воздух (авария на химически опасном объекте, утечка или разлив аммиака).	<ol> <li>Наложите на лицо ватно-марлевую повязку, смоченную в 2%-ном растворе борной, лимонной или уксусной кислоты или смоченную водой.</li> <li>Закройте окна, форточки и двери.</li> <li>Включите радио, телевизор и прослушайте сообщение органа управления МЧС России.</li> <li>Сообщите об опасности своим соседям.</li> <li>Произведите герметизацию помещений.</li> </ol>
ПОМНИТЕ - аммиак бесцветен, легче	6. не пользуйтесь открытым огнем - в помещении при смешивании аммиака с воздухом может

Возможные ситуации	ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
воздуха, его пары поднимаются вверх и	образоваться взрывоопасная смесь.
передвигаются ветром, хорошо	7. Если облако не исчезает и запах не уменьшается, выходите из зоны заражения перпендикулярно
растворим в воде, опасен при вдыхании.	направлению ветра (выходить надо обязательно в ватно-марлевой повязке).
	8. Верхнюю одежду плотно застегните, поднимите воротник, наденьте головной убор.
5. Отравление аммиаком	1. Вынесите пострадавшего на свежий воздух, обеспечьте покой.
(ощущение удушья, кашель,	2. Давайте пить только теплое молоко с боржоми или питьевой водой.
раздражение кожи, слезотечение,	3. Принимайте кодеин по 1 таблетке 2 раза в день.
насморк, боли в желудке).	4. При спазмах горла положите теплую грелку на область шеи. Принимайте теплые водные
• ,	ингаляции. В домашних условиях дышите воздухом над нагретой кастрюлей с водой.
	5. При поражении кожи обильно промойте ее не менее 15 минут водой или 2%-ным раствором
	борной или лимонной кислоты. В глаза закапать 30%-ный раствор альбуцида, в нос - теплое
	оливковое или персиковое масло.
	6. Делать искусственное дыхание запрещается.
6. Территория заражена	1. Территорию обработайте водой и засыпьте местными подручными материалами - сухой
аммиаком, ее надо дегазировать.	измельченной глиной, торфом, песком (толщина слоя засыпки не менее 0,5 см).
_	2. Промойте зараженную поверхность водным раствором хлорной извести или хлорамином,
	солями гирохлорида кальция.
	1. Наденьте противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную в 2%-ном растворе питьевой
7. Резкий запах хлора в помещении,	воды.
квартире, виден затуманенный	2. Закройте все окна и двери.
воздух зеленоватожелтого цвета	3. Включите радио, телевизор и прослушайте сообщение органа управления МЧС России.
(авария на химически опасном	4. Сообщите об опасности своим соседям.
объекте, утечка или разлив хлора).	5. Если облако не исчезает, выходите из зоны заражения перпендикулярно направлению ветра,
ПОМНИТЕ - хлор тяжелее воздуха, его	обходя низкие участки, подвалы, тоннели, обязательно в средствах индивидуальной защиты органов
пары распро-страняются по	дыхания и кожи (табельных и подручных).
поверхности земли, малорастворим в	6. При невозможности выйти из зоны заражения поднимитесь на верхние этажи здания.
8. Отравление хлором	1. Вынесите пострадавшего на свежий воздух, обеспечьте полный покой. При остановке дыхания
8. Отравление хлором (возникновение сухого кашля,	1. Вынесите пострадавшего на свежии воздух, обеспечьте полный покой. при остановке дыхания сделайте искусственное дыхание.
(возникновение сухого кашля, одышки, рези в глазах,	2. Дайте вдыхать нашатырный спирт.
слезоточения, резкой загрудинной	3. Кожные покровы, рот, нос промойте 2%-ным раствором питьевой соды.
боли как при сердечном приступе).	4. Давайте пить теплое молоко с боржоми или содой, кофе.
ооли как при сердечном приступе).	4. Даваите пить теплос молоко с обржоми или содой, кофе. 5. При продолжении удушья обратитесь за помощью к медицинским работникам.
	<ol> <li>при продолжении удушья обратитесь за помощью к медицинским работникам.</li> </ol>

Возможные ситуации	ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
9. Территория заражена хлором, ее	1. Место разлива залейте водой, нейтрализуйте гашеной известью или 5%-ным раствором
надо дегазировать.	каустической соды.
	2. Территорию засыпьте местными подручными материалами - сухой измельченной глиной либо
	торфом, песком (толщина слоя засыпки не менее 0,5 см).
10. Отравление угарным газом (окись углерода СО - выхлопные газы автомашины, неправильная топка печей) развивается постепенно и незаметно для людей.	ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ - боль в висках, боль в лобовой части, шум в ушах, потемнение в глазах. Затем - мышечная слабость, особенно в ногах, головная боль, затруднение дыхания, тошнота, рвота, возбуждение или оглушенное состояние, потеря сознания.  1. Вынесите пострадавшего из зоны заражения или интенсивно проветрите помещение.  2. В очагах пожаров наденьте на пострадавшего изолирующий или фильтрующий противогаз (ГП-5, ГП-7) с универсальными патронами ПЗУ-ПК.  3. После эвакуации из зоны заражения дайте вдыхать нашатырный спирт.  4. Наложите на голову и грудь холодный компресс.  5. По возможности давайте вдыхать увлажненный кислород (в условиях медпункта).
	6. При остановке дыхания сделайте искусственное дыхание.
11.Отравление прижигающими жидкостями	(при небрежном хранении, нарушении техники безопасности, авариях они могут попадать на кожные покровы и слизистые оболочки, вызывая химические ожоги кожи, глаз и дыхательных путей; при попадании внутрь вызывают ожог слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, оказывают токсическое действие на организм).
- азотной, серной или соляной кислотами:	1. Вынесите пострадавшего на свежий воздух и снимите с него загрязненную одежду. 2. Смойте с кожи кислоту большим количеством 2%-ного раствора питьевой соды или 30%- ного раствора альбуцида (глаза промойте струей этих растворов). 3. Не вызывайте рвоту искусственным путем.
- аммиачной водой, нашатырным спиртом, каустической содой, а также средствами бытовой химии (стиральными порошками, препаратами для мытья посуды, ванн, стекол и т.п.)	<ol> <li>Выведите пострадавшего на свежий воздух, снимите загрязненную одежду, тепло оденьте его в незараженную одежду.</li> <li>При попадании на кожу указанных веществ смойте их обильной струей воды в течение 5-7 минут.</li> <li>При попадании в глаза промывайте их струей воды в течение 10-30 минут. Закапайте 30%- ный раствор альбуцида.</li> <li>При попадании во внутрь дайте выпить 1-2 стакана молока или холодной воды. Употребляйте в пищу растительное масло.</li> <li>В условиях медпункта дайте пострадавшему вдыхать увлажненный кислород.</li> </ol>

Возможные ситуации	ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
12. Отравление кожи и	$(\Phi OC$ - это жидкие и твердые ядохимикаты с высокой токсичностью для борьбы с
дыхательных путей фосфоро-	различными вредителями в сельском хозяйстве и в быту: тифос, карбофос, октаиетил, фосфалид
органическими соединениями)	и другие
СИМТОМЫ - резкое сужение зрачков,	1. Удалите яд с поверхности кожи влажным тампоном.
обильное слюно-отделение,	2. При попадании внутрь промойте желудок и примите активированный уголь.
затрудненное дыхание.	3. Обмойте зараженные части тела щелочными, мыльными, содовыми растворами.
	4. При попадании в глаза промойте их водой или 2%-ным раствором питьевой соды.
	Если ФОС распыляют в воздухе, обязательно наденьте противогаз и средства защиты кожи.
15. Герметизация помещений,	1. Законопатьте щели и трещины в дверных коробках ватой, тряпками, а в дальнейшем
квартиры, дома.	промажьте замазкой или заклейте полосками плотной бумаги.
	2. Заклейте щели оконных рам несколькими слоями плотной бумаги.
	3. Заложите вентиляционные решетки, дымоходы, трубы картоном или фанерой, используя для
	этого клейкую полимерную ленту или другие средства.
	4. Закройте окна, чердаки, веранды.
16. Повышение радиационного	1. Предупредите об опасности всех своих соседей. Если поблизости есть убежище, укройтесь в
фона (авария на АЭС, других	нем (по указаниям органов управления МЧС России).
радиационно-опасных объектах и	2. При отсутствии убежища загерметизируйте помещение, в котором вы находитесь. Уберите
связанное с этим выпадание	продукты в холодильник, оставшиеся упакуйте в полиэтиленовые или бумажные пакеты и
радиоактивных осадков).	положите в шкаф, плотно закройте их. Сделайте запас воды в плотно закрытых бутылках и в ванной
	комнате под полиэтиленовой пленкой
	5. Начинайте ежедневно по 1 разу после еды в течение 7 суток принимать радиозащитное
	средство (иодистый калий по 0,125 г), запивая его молоком или киселем. Если у вас нет йодистого
	калия, изготовьте простейшее радиозащитное средство из спиртового 5%-ного раствора йода -
	выпивать по стакану для взрослых (3-5 капель на стакан воды) или по 100 грамм для детей (1-2
ПРИМЕЧАНИЕ - естественный	капли на стакан воды, молока).
радиационный фон гамма-излучения в	6. Не выходите на улицу без крайней нужды, а если необходимо - только в средствах
различных регионах не одинаковый и	индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, передвигайтесь по асфальтированным участкам
может составлять от 10 до 60 микрорентген/час (мкР/ч) или от 0,1 до	дорог.
0,6 микрозивертов/час (мкЗв/ч) и более.	7. Длительность нахождения в помещении определяется органами управления МЧС России -
o,o mmposuoepmoor me (mmsor i) n oonee.	слушайте радио, смотрите телевизор и следите за информацией.
	8. Пищу принимать только в помещениях, руки мыть с мылом, рот полоскать 0,5%-ным
	раствором питьевой соды.
	- Заверните загрязненные денежные билеты в целлофан.
	- Тщательно вымойте руки с мылом.

Возможные ситуации	ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
При обнаружении зараженных	- Немедленно сдайте загрязненные деньги в ближайший банк и получите их замену (или
радиоактивными веществами	обратитесь в штаб ГОЧС).
денежных билетов (после	
соответствующего дозиметрического	
контроля).	
17. Выход из зоны заражения	1. Если есть возможность, то сразу снимите всю одежду (при наличии возможности сдайте ее
радиоактивными веществами -	органам управления МЧС на захоронение в специально отведенных местах), вымойтесь теплой
необходимо провести	водой под душем, смените одежду и белье.
спецобработку (дезактивацию), т.к.	2. Если такой возможности нет, то оставаясь в противогазе и встав спиной к ветру, снимите с себя
радиоактивная пыль может	верхнюю одежду (пальто, плащ, накидку).
оставаться в складках одежды и на	3. Тщательно вытряхните одежду, затем повесьте ее на веревку или перекладину и обметите
коже.	сверху вниз веником, щеткой.
18. Выход из зоны заражения	1. Тщательно осмотрите себя и окружающих людей: нет ли капель АХОВ на открытых участках
аварийно химически опасными	кожи или одежды.
веществами (АХОВ) - необходимо	2. При обнаружении капель снимите их ветошью, куском ткани, бумагой методом
провести спецобработку	промокания.
(дегазацию), т.к. отравляющие	3. Тщательно вытряхните верхнюю одежду, очистите обувь и средства защиты от пыли и
вещества могут оставаться на	<u> </u>
одежде и кожных покровах.	4. Дома или на санитарно-обмывочном пункте смените одежду на чистую и вымойтесь под
19. Нахождение на территории, где	1. Строго соблюдайте все указанные противо-эпидемические мероприятия.
распространилась опасная	2. Максимально сократите ваши контакты с другими людьми, прекратите посещение
инфекция (вводятся карантин или	общественных мест со скоплением людей, без крайней необходимости не выходите из квартиры или
обсервация)	делайте это только в средствах защиты.
	3. При первых же признаках заболевания обращайтесь к врачу.
	4. Не уклоняйтесь от приема лечебно-профилактических средств, назначенных медицинскими
	специалистами МЧС.